

Pêveka 1

(Benda 1, Jimareya. 2.3, Hevoka 1)

Belgeya Şîreta Bo Penaberan Taybet bo Taqîkirinê Bijîşkî ji alîyê Koma Saxlemîya Giştî

Hûn wek penaberek hatine eyaleta Saxony û hûnê bîlez ji alîyê wezareta saxlemîya giştî tê taqîyê bijîşkî ji we bîn girtin. Bi xwandina ser nexweşîyê giştîgîr bîlez û bez, ev wan pênas diken û tedawî diken û kiryarê bergirîyê pêk dînin. Lêkolîna ser ev xizmetan di asta yekim da ser berjewendîyê te ye û herwisa di ser bejewendîyê wan kesane ku gel te dijîn.

Ev lêkolîne pêk tê ji taqîkirina fîzîkî ya giştî (bi qasî kêrhatî bo pênas kirina nexweşîyek giştîgîr), sîtavka x-ray ji singî (ji temenê 15 salî û mezintir) yan taqîya kevilî bo êşa zirav bo zarrokên ku 15 roj ser rojbûna wan derbaz dibe û jinê pêgirî, herwisa bo kesê ku temen wan zêdetir ji 13 sala ne taqîkirina xwînê ji bûna nexweşîya cerg kulfiyên (hepatîtên) A û B (zerbûna çirkîn) û herwisa ewleh bûn li hember sorikê, bineguh, mîrkutik û nokolreş. Dema ku nexweşîyek gumanbar be, taqî kirina destava stûr di pathogenan tê ji çirka rûvîyê pê bê.

Eger bijîşkê Wezareta Saxlemîyê nîşaneyên nexweşîyên dî peyda kirin, gengaze taqîyên dî ji we bîne girtin.

Paş bi dawî hatina taqîyan, tê bawernameya saxlemîyê ji were bê derbirîn.

Eger pêwîst be ku pêş ji berferêh bûna nexweşîyek giştîgîr bê girtin yan şahidîyek ji nexweşîyê berçav be û pêdivî bi derman hebe, wezareta saxlemîyê tê ji rayedarê dî yan peydaker re bişînin.

Di mijarên dî da, encamên lêkolînê tenê demekê tê ji ajansên dî re bîne birê kirim ku rezamendîya we liser hebe.

Bo bidest anîna agahîyê bêtir liser parastina saxlemîya penaberan, ev di Ofîsa Qeydkirina Xelkê Bîyanî ya Navendî da berdestin û paşê berpirse liser rêveberîya saxlemîya we ya giştî.

Ji we tê daxwaz kirin ku forma bîrxistinê teji biken (pirrsên liser dîroka saxlemîyê) ku dikeve ber destê te û dibê vê pêşkêşî bijîşkê berpirsê saxlemîyê ku rêveberîya ev lêkolînê dike, biken.

Kerema xwe bo her zarrokek xwe pirsnameyekê pîrr biken.

Eger pêwîst be rabêjkarek liser HÎV / AIDS, hepatîtên C û nexweşîyên dî yê guhaztî pê têkilîya cinsî û herwisa taqîyên taqîgehî yê kêrhatî gengaze ji alîyê rêveberîya saxlemîya giştî ya heremî ya kêrhatî li zêdetir ji taqîyên destpêkî tê ji we bê standin. Eger we metirsîya tûşîbûna ji ev nexweşkera di pêşerojê da hebe yan berê nîşaneyên hatî şirove kirin ser we xûya bibin, ev taqîye pîr bi mifa ye. Ev lêkolîne bi tevahî xwebexşaneyê û tenê pê rezamendîyê we tê pêk bê. Encama Taqîya we tê bi tevahî nehîni bimîne.

Agahîyên ser Nexweşîya

HÎV / Enfeksiyona AIDS

AIDS navê êşekê ye ku pergala xweparastinê bi sedema enfeksiyona pê vîrûsa ruxandina xweparastina mirovan (HÎV) dirûxîne. vîrûsa ruxandina xweparastina mirovan (HÎV) enfeksiyon dike û bi taybet hucreyên ewlehîya leşî diruxînît. Çend hefteyan paş tûşî bûna vîrûsa HÎV nîşaneyên wekî sir lêdanê wekî ta û eşa leşî gengaze derkeve. Encamên zêdetir yê eşa HÎV yê gelek şexsî ne. Girêdayî bi zêde bûna zîrarra pergala xweparastinê, gengaze ev bibe sedem tûşî bûna enfeksiyona cidî pê derdzêyana ku dikare bo pergala parastina saxlemîyê bizirarr be, û herwisa bibe sedema nexweşîya kansêrên nadir û nexweşîya girana pergala damarên navendî.

Hepatitis C

Enfeksiyona pê vîrûsa Hepatîta C (HCV) bi pirranî nehînî dimîne. Tevî vê şexs helgirê vîrûsa vegire. Eger nîşaneyên vê xûya ken, nîşaneyê vê pêk tîn ji, ji dest çûna elaqeya xwarin, mandîbûn, êşa endama û êşa movika, eşa serzik, êlinc rabûn , verêşan û ta ya sivik, zêdetir ji vê, zerbûna zêde ya kevilî û werema çavan. Gelek kêr nexweşek HCV bixwe xwe derman dike. Di sê ji çar ji giş babetan, helbet nexweşî, paş çend salan tûşî bûn, gengaze zirarek giran bigehîşe kezebê.

Agire

Agire (herwisaagire jî rm binav kirin) nexweşîyek hevpara enfeksiyonê. Agire bi sedema bakterîyên mîkroskopîk çê dibin. Pêvajoya nexweşîya agire di çend asatan da ye. Nîşaneyên vê pir cûda û alozin.

Gengaze 3 hefteyan paş enfeksiyon xala têketina patojenê (wekî oregana seksî) vezîkol form û paşê birîn be ku bê êşe û xwe bi xwe çê dibe. Enfeksiyon bêguman nabe sebaba ruxandinê lê diakre bibe pêvajoyek kronîk. Di tevahîya leşî da gengaze zerer û rewşa lenfbûnê biqewimê. Çend salan paşê enfeksiyon gengaze bibe sedema zirara berdewama organên wekî, dil, aorta mezin, kezeb, hestî û pergala damaran.

Eger di maweya pêgiranîyê da tûşî nexweşîya agire bibin, bakterî dikarin bibine sebaba zirarra giran ser zarrokê zikê we da.