

Pneumokokken-Impfung – Übersicht zu Änderungen ab 19. Mai 2017

| Personengruppe/ Indikationen | | Auswahl des Impfstoffs ¹ | Abrechnung der Impfleistung | Altersgruppen/ Hinweise |
|--|---|--|--|---|
| Säuglinge | | PCV10/ PCV13 | 89118A/B | Grundimmunisierung reif geborener Säuglinge |
| Personen über 60 Jahre | | PPSV23 | Erstimpfung: 89119 ggf. Auffrischung: 89119R | Impfung mit PPSV23 → ggf. Wiederholungsimpfungen mit PPSV23 im Abstand von mind. 6 Jahren nach indiv. Indikationsstellung |
| Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grundkrankheit | 1. angeborene oder erworbene Immundefekte bzw. Immunsuppression Details siehe SI-RL | PCV13, PPSV23 (sequenzielle Impfung) | 89120 | sequenzielle Impfung² (PCV13, gefolgt von PPSV23 nach 6-12 Monaten) |
| | 2. sonstige chron. Krankheiten Details siehe SI-RL | Alter ≥ 16 Jahre: PPSV23 | 89120 | Alter ≥ 16 Jahre: PPSV23 |
| | | Alter 2-15 Jahre: PCV13, PPSV23 (sequenzielle Impfung) | 89120 | sequenzielle Impfung² (PCV13, gefolgt von PPSV23 nach 6-12 Monaten) |
| | 3. Anatom. und Fremdkörper-assoziierte Risiken für Pneumokokkenmeningitis Details siehe SI-RL (z. B. Cochlea-Implantat, Liquorfistel) | PCV13, PPSV23 (sequenzielle Impfung) | 89120 | sequenzielle Impfung² (PCV13, gefolgt von PPSV23 nach 6-12 Monaten) |
| | 4. Berufliche Indikationen Details siehe SI-RL | PPSV23 | i. d. R. Arbeitgeberleistung | Impfung mit PPSV23 |
| | Alle Risikogruppen | PPSV23 | Auffrischung: 89120R | Wiederholungsimpfung nach frühestens 6 Jahren aufgrund begrenzter Dauer des Impfschutzes Wiederholungsimpfung mit PPSV23 in allen Risikogruppen, Mindestabstand 6 Jahre |

¹ Verordnung erfolgt wie bisher: Sprechstundenbedarf AOK PLUS

² wenn bereits früher Impfung mit PCV13 erfolgte → Impfung nur mit PPSV23; wenn bereits Impfung mit PPSV23 → Impfung mit PCV13 im Abstand von mindestens 1 Jahr (Epi.Bull. 34/2016, S. 314)

PCV10 – Pneumococcal Conjugate Vaccine (10-valenter Konjugat-Impfstoff)

PCV13 – Pneumococcal Conjugate Vaccine (13-valenter Konjugat-Impfstoff)

PPSV23 – Pneumococcal Polysaccharides Vaccine (23-valenter Polysaccharid-Impfstoff)

SI-RL - Schutzimpfungs-Richtlinie, <https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/60/>